



## Flowchart

### Ambulant abstinenssymptombehandling- og scoring

#### Dag 1=Alkoholmetertest =0‰= 1.ædru dag

Patienten introduceres til SAWS-skemaet og i at udføre selvscoring på samme tidspunkt hver dag.

**Alle patienter udfylder Startscore** ud fra de sidste 24 timer( evt sammen med behandler) skrives på skemaet

Hvis patienten er tilfreds med medicinmængden udleveret fra afrusningen og **Startscoren** er mindre end 12, gentages afrusnings doseringen.

Hvis patienten er føler der er givet for lidt medicin uafhængig ad SAWS-score medgives forgående døgn dosering + 4 tabl. ekstra, inden for den faste ordinationsramme.

Hvis patienten er meget påvirket af medicinen, drøftes med patienten om hvornår bivirkningerne opstod, der reduceres i dosis i samarbejde med patienten, notat til journal laves. Nogle patienter udtrykker oplevelser af bivirkninger i form af træthed, svimmelhed, manglende koncentrationsevne med videre. Ved mistanke om **svære bivirkninger** skal patienten tilbydes indlæggelse.

Hvis patienten er tilfreds med behandlingen og scoren er større end eller lig med 12 foreslås forgående døgn dosering + 4 tabl. ekstra, inden for den faste ordinationsramme.

Patienter der kommer fra indlæggelse, må det bero på en vurdering hvad startdosis skal være. Eventuelt ved at indlæggelsesafdeling ringes op.

*Ved promille =0 er rammeordinationen ved symptomstyret behandling er op til 12 tabletter Risolid®/Klopoxid® (Chlordiazepoxid) a 10mg/25mg daglig i max 5 dage( 600mg totalt/ 1500mg totalt) der kan gives P.N. 4 tabletter ekstra Risolid®/Klopoxid® (Chlordiazepoxid) a 10mg/25mg . Resterende tabletter afleveres ved fremmøde.*

#### 2 ædru Dag

Scoring falder tag udgangspunkt i medicinering fra dagen før og aftrap med 2 tabletter, bed patienten om at komme med resterende tabletter ved næste fremmøde.

Scoring stiger overvej benzodiazepinafhængighed, overvej differentialdiagnoser, hvis disse forkastes: **samme dosering som dag 1+ 4 tabl.ekstra, læge kontaktes.**

Scoring uændret, overvej om patienten har taget tabletter nok. **samme dosering som dag 1.**

Se dag 2

3og 4 og 5 ædru Dag

#### 6 ædru Dag

SAWS-score er mindre end 12: Behandling stoppes.

SAWS-score er lig med eller større end 12: Overvej differentialdiagnoser, kontakt læge.

Hvis ingen differentialdiagnose så fortsæt aftrapning efter fikseret skema til score < 2 og max i 10 dage.

*For enkelte patienter er det nødvendigt med en fortsat behandling med tabl. Risolid®/Klopoxid® (Chlordiazepoxid) a 10mg/25 mg, aftrappet over 8-10 dage. Fortsæt scoring i op til 10 dage.*